

## Obavijest vinogradarima!

Kategorija: Objave

Objavljeno: Petak, 09 Lipanj 2017 07:02

Autor: JUO

Pregleda: 1862



### Obavijest za poljoprivrednike Avviso agli agricoltori

Savjetodavna služba  
Brtonigla, 09.06.2017 god.

U Istri je na širem području i prošle godine potvrđena zlatna žutica vinove loze koju prouzrokuje štetni organizam *Grapevine flavescens doree* MLO.

(Popis svih katarstaskih općina, gdje je fitoplazma potvrđena, nalazi se u Narodnim novinama br.51/17).

Simptomi zlatne žutice vinove loze postaju vidljivi krajem lipnja, u srpnju i kolovozu.

Kod većine sorata rubovi lišća se uvijaju prema dolje ( kod malvazije ne) pa listovi u većini slučajeva poprime trokutast izgled. Kod bijelih sorata boja lišća je svijetlo zelena do zlatno žuta a kod tamnih sorata poprimaju crvenkastu boju. Oboljelo lišće dozrijeva ranije, a otpada kasnije. Lišće je krto i stiskom u ruci se lomi. Karakteristično je također da mladice ne dozrijevaju ravnomjerno a najčešće ostaju potpuno zelene do kraja vegetacije.

Fitoplazme sa zaraženih na zdrave biljake prenose cikade, a bolest se može širiti i zaraženim sadnim materijalom.

## Obavijest vinogradarima!

Kategorija: Objave

Objavljeno: Petak, 09 Lipanj 2017 07:02

Autor: JUO

Pregleda: 1862

---

Direktnih mjera za suzbijanje fitoplazmi nema, pa je potrebno indirektnim mjerama kao što su sadnja zdravog sadnog materijala i suzbijanje vektora spriječiti pojavu i širenje fitoplazmi.

Cikada, poznata pod nazivom američki cvrčak (*Scaphoides titanus*) prenosi fitoplazmu *Flavescens doree*.

Na zaraženim i sigurnosnim područjima potrebno provoditi mjere zaštite usmjerene protiv američkog cvrčka. Vinogradare na to obvezuje i Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze ( NN 46/17).

Također je donesena i Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprečavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju prouzrokuje štetni organizam *Grapevine flavescens doree* ( NN 51/17).

Krajem ovog i početkom drugog tjedna, vrijeme je da se provede prvo tretiranje.

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi : Actara 25 WG, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC, Asset te Cythrin Max.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati u vrijeme kada pčele ne lete ( večernji sati )!!!

Upućuju se svi vinogradari s područja Istre da su obvezni :

- provoditi redovite vizualne preglede vinove loze radi uočavanja eventualnih simptoma zaraze
- izvještavati nadležnog fitosanitarnog inspektora o uočenim simptomima zaraze
- uklanjati i uništavati ,o vlastitom trošku, trsove koje je nadležni fitosanitarni inspektor rješenjem naredio
- krčiti zaražene vinograde i običnu pavitinu - sporednu biljku domaćina zlatne žutice
- pratiti pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča od početka srpnja do kraja rujna
- Suzbijati američkog cvrčka u zaraženom i sigurnosnom području u svim

## Obavijest vinogradarima!

Kategorija: Objave

Objavljeno: Petak, 09 Lipanj 2017 07:02

Autor: JUO

Pregleda: 1862

---

vinogradima i rasadnicima vinove loze

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: <http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>.

Kratko pojašnjenje:

Demarkirano područje sastoji se od zaraženog područja ( područje najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost štetnog organizma) i sigurnosnog područja oko žarišta najmanje 5 km od računajući od granice zaraženog područja.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.  
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr